

PRIMER ESLABON DE LA CASCADA DEL CONTINUO DE LA ATENCION DE VIH: EXPERIENCIA INTERDISCIPLINARIA DE TESTEO VOLUNTARIO 2013-2016




M ROCCULI, V RODRIGUEZ, A ARCURI, M BURGOS, D RUSSO LACERNA, A MOLINA, A CAGNONI, A GUZMAN, C CARABAJAL, S BERNABO, M KIELMANOVICH, A JOSKOWICZ, A MONIÑO, C LAVAGNINO, M COLODRERO, M CORMICK, A MAIDANIK, A ZERDIEW, S ROSELL/HOSPITAL GENERAL DE AGUDOS DR. ENRIQUE TORNU, ARGENTINA.

OBJETIVO. Describir las campañas de testeo voluntario de VIH con test rápido (TR), realizadas por equipos interdisciplinarios de un Hospital de la CABA entre 2013-2016.

MATERIALES Y MÉTODOS. Varios equipos integrados por médicos infectólogos, bioquímicos, técnicos, personal de Área Programática, CePAD, residentes de Educación para la Salud, enfermeras, y administrativos, pertenecientes al hospital abordaron estrategias para el testeo voluntario de VIH dentro y fuera de la institución. En todas las campañas se utilizó TR de 3º generación (Alere). Las personas con TR + fueron citadas en el hospital para confirmación con ELISA 4º (VIH-Combo de Abbott). Las variables de interés fueron: edad, sexo, TR+, ELISA 4º reactivos, % de Invalidados y tasa de retiro. Estadística descriptiva y analítica. Programa estadístico SPSS15 y Stata 10.

RESULTADOS. Entre 2013-2016 se realizaron 11 campañas (promedio 2,75 campañas/año), Con un máximo de TR: 280/730 en el 2015(38.4%). El 86.90% la población estuvo constituida por: 159 estudiantes adultos, 286 personas vinculadas al hospital, 73 de una comunidad cerrada, y 212 del Área programática. El grupo mayoritario tuvo de 20-40 años (57.70%). La concordancia entre TR y ELISA de 4º: 100%. La prevalencia: 0.69%, siendo el grupo de mayor casuística: 20-40 años (80%). El 60% de los TR positivos correspondieron a hombres. La tasa de retiro: 95.21% e Invalidados: 0.27%.

TESTEOS EN FUNCION DEL AÑO



VARIABLE	RESULTADO
TESTEADOS	730
mediana de edad (RIC)	36 (25-50)
sexo H/M	0,69 (P<0,01)
TR +	5/730
VIH POSITIVOS	4/730
PREVALENCIA	0,69%
RETIRO %	95,21
NO CONFIRMADOS	1 DE 5



CONCLUSIONES. 1.-Se confirmó entre 2013-2016 la actividad proactiva sostenida del hospital para el diagnóstico de VIH. 2.-Los grupos testeados cumplieron la expectativa de ser amplios (15-95 años) y pertenecientes a distintos estratos. 3.-En todas las campañas mostraron más adhesión las mujeres. 4.-Hubo concordancia con el boletín epidemiológico de VIH/SIDA Nº 33 (2016) en: prevalencia para jóvenes y adultos de toda la población (0,4%), más infectados hombres que mujeres (2 a 1), y edad de diagnóstico (H: 33 años, M: 32 años). 5.-No hubo falsos positivos y la tasa de retiro fue la esperada para este tipo de campañas (>95%). 6.-El bajo porcentaje de Invalidados se asoció a la bondad del test y al entrenamiento de los equipos. 7.-Los grupos interdisciplinarios permitieron abordar estrategias más integrales, contemplando que la problemática del VIH tiene aspectos médicos, psicológicos, y socioculturales complejos.