

M Romano,¹ G Villar,² V Arreghini,¹ R Cardone,¹ G Benedetti,¹ J Orlando,¹ A Cassata,¹ D Alvarado,¹ E Quiroga,¹ S Attorri,¹
¹ Servicio de Infectología, Hospital "Luis C. Lagomaggiore" (Mendoza, Argentina)
² Área de Serología, Hospital "Luis C. Lagomaggiore" (Mendoza, Argentina)

Poster N° 0184

INTRODUCCIÓN

El tratamiento tripanocida de la mujer en edad fértil disminuye la transmisión vertical de la infección y la morbimortalidad asociada. A pesar de estos beneficios, se estima que sólo el 1% de la población mundial infectada ha sido tratada.


OBJETIVOS

Determinar qué porcentaje de pacientes puérperas con infección crónica chagásica completó el tratamiento tripanocida.

MATERIAL Y MÉTODOS

Análisis retrospectivo y descriptivo de las mujeres en edad fértil con Enfermedad de Chagas crónica diagnosticadas y tratadas durante el periodo 2013-2016 en un hospital de referencia en Obstetricia en la provincia de Mendoza, Argentina. Se analizaron variables demográficas, epidemiológicas y clínicas. Se evaluó también, la respuesta clínica al tratamiento tripanocida. El análisis estadístico se realizó a través del programa Epi Info7.

RESULTADOS



Características demográficas

Edad	Zona de residencia
28,8 años (15-45)	79% zona urbana


Características epidemiológicas

Seroprevalencia anual	Antecedente de madre chagásica
3%	50%

Características clínicas

Cardiopatía chagásica (Kuschnir O)	Cardiopatía chagásica (Kuschnir 1)
76% (13/17)	24% (4/17)

Respuesta al tratamiento



CONCLUSIONES

La población estudiada es menor a 30 años, de nacionalidad argentina y domiciliada en zona urbana. Sólo en 1.4% de la población, completó el tratamiento tripanocida. Los porcentajes de toxicidad y suspensión del Benznidazol son similares a los reportados en la literatura. Se registró un caso de cura infectológica durante el corto periodo de seguimiento.