

# 0605 TUBERCULOSIS GENITAL. Reporte de un caso.

A Zárate, M Lerda, F Villarroel, F Manavella, MV Becker, A Gómez, A Gastaldi  
Hospital José María Cullen, Argentina



## INTRODUCCIÓN

La Tuberculosis es una enfermedad infecto-contagiosa prevalente en nuestro medio, considerada un problema de salud a nivel mundial. El compromiso extrapulmonar comprende del 15 al 20% de los casos, siendo la Tuberculosis urogenital, una forma rara de presentación.

**Se presenta una paciente puérpera con piosálpinx por *Micobacterium spp.***

## CUADRO CLINICO

### Antecedentes Personales

- 20 años de edad
- puerperio alejado (40 d)
- Parto normal de 1° gesta
- Poca ganancia ponderal durante el embarazo
- Anemia

### Motivo de Consulta

- Dolor abdominal inespecífico
- Registros febriles

### Examen Físico

- Mal aspecto general
- Adelgazada
- Signos vitales conservados
- Dolor a la palpación de HAI sin defensa ni despegue

## EXAMENES COMPLEMENTARIOS

GB	7220 (N 87)
Hb	8,2
RP	432 mil
VES	15
ELISA HIV	Neg
Albu mina	2,2

**TAC de TÓRAX y ABDOMEN:** infiltrados nodulares en ambos vértices pulmonares con áreas de árbol en brote e imagen hipodensa en trompa uterina junto a líquido libre.

### EVOLUCIÓN:

- inicia tratamiento con ampicilina sulbactam.
- persiste con registros febriles y evoluciona con compromiso hemodinámico e insuficiencia respiratoria con requerimiento de ARM e inotrópicos
- Se realiza laparotomía exploradora donde se constata hemoperitoneo, plastrón utero-intestinal e implantes nodulares en intestino delgado, compatibles con TBC peritoneal. Se efectúa salpinguectomía izquierda, enviándose muestras a cultivo.
- Pasa a UTI en el post operatorio inmediato, iniciando cuádruple asociación.

Muestras trompa uterina (directo ) positivo para BAAR  
Anatomía patológica: infiltrado inflamatorio y granulomas, compatible con TUBERCULOSIS



## CONCLUSIONES:

***La tuberculosis ginecológica es una entidad infrecuente, cuyo diagnóstico requiere un elevado índice de sospecha. Debe considerarse en todo paciente con síndrome constitucional y fiebre asociados a síntomas de cronicidad. A pesar de que el VIH es hoy la inmunosupresión mas frecuentemente asociada con esta enfermedad, no debemos olvidar otras causas como la desnutrición y el embarazo, como en el caso de nuestra paciente.***