



TRATAMIENTO PARASITICIDA EN PACIENTES ADULTOS EN FASE INDETERMINADA Y CRÓNICA EN LA ENFERMEDAD DE CHAGAS: EXPERIENCIA EN HOSPITAL PÚBLICO DE CABA



Alvaro Otreras¹, MT Rodriguez Brieschke¹, B Lauge¹, C Nieto¹, P Peyran², C López Albizu², P Scapellato¹

Unidad de Infectología Hospital Donación Francisco Santojanni¹
 Departamento Diagnóstico Instituto Nacional de Parasitología Mario Fatała Chabén²
 Hospital General de Agudos Donación F. Santojanni
 Pilar 950. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Argentina.
 E-mail: aotreras@intramed.net

La enfermedad de Chagas-Mazza es una importante causa de morbimortalidad en América latina y es considerada una enfermedad emergente en países del primer mundo. Si bien, no hay consenso en la utilidad de tratar a los adultos con formas crónicas, se especula que considerar el mismo en adultos jóvenes, podría evitar el progreso de la patología cardiovascular. Del mismo modo, se teoriza con que el tratamiento de las mujeres en edad fértil, disminuiría el riesgo de transmisión vertical. Los eventos adversos son una importante limitación para el tratamiento de adultos.

OBJETIVOS DEL ESTUDIO

Describir nuestra experiencia en el tratamiento parasiticida de pacientes adultos chagásicos en fase indeterminada y crónica, en un hospital de área no endémica.
 Evaluar la tolerancia y efectos adversos del tratamiento.

MATERIAL Y MÉTODOS

Estudio de casos, prospectivo, realizado en un hospital público de la CABA. Entre el 1/1/2014 y 31/12/2016.


Inclusión: Pacientes con diagnóstico de Chagas, de entre 18 y 65 años, s/enfermedad cardiovascular ni digestiva, c/score Kuschner 0 y 1.

Exclusión: mujeres embarazadas o en período de lactancia. , mayores de 65 años, patología digestiva chagásica demostrada y pacientes con Kuschner 2 y 3.


- Todos los pacientes firmaron un consentimiento informado.
- Los pacientes recibieron benznidazol (dosis 5 mg/kg/dosis).
- Se les efectuó un laboratorio de seguridad semanal y se confeccionó una grilla para automonitoreo diario de efectos adversos.
- Seguimiento semestral de serologías cuantitativas de todos los pacientes incluidos. Se efectuó PCR p/Chagas post-tratamiento (15 a 45 días de finalizado).

RESULTADOS

TRATAMIENTO



Proporción de pacientes según el sexo



-Nº de pacientes evaluados **23**

-Mediana de edad **31** años

EFFECTOS ADVERSOS



Proporción de positividad de PCR pre y postratamiento



Proporción de pacientes por Nacionalidad



CONCLUSIONES

En esta experiencia no se hallaron eventos adversos graves relacionados con la medicación. Si bien no fue el objetivo principal del estudio y el seguimiento es corto consideramos que la negativización de la PCR en estos pacientes no deja de ser una situación alentadora a pensar en una eventual cura parasitológica.