

ADHERENCIA AL TRATAMIENTO DE LOS CASOS DE INFECCIÓN POR VIH EN VILLA MARÍA, CÓRDOBA, ENTRE 2011 Y 2015.

PE124

Autores: Carreño N⁽¹⁾, Frola S⁽²⁾, Bossio JC⁽³⁾, Sanchís I⁽⁴⁾, Armando G⁽³⁾, Ortega G⁽²⁾, Semenzin C⁽¹⁾, Ronco M⁽²⁾, Jure H⁽¹⁾
⁽¹⁾ Hospital Regional Pasteur, Villa María, Córdoba; ⁽²⁾ Secretaría de Salud de Villa María, Córdoba; ⁽³⁾ Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER) "Emilio Coni", Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) "Carlos G. Malbrán", Ministerio de Salud de la Nación; ⁽⁴⁾ Cátedra de Epidemiología y Salud Pública, Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas (FBCB), Universidad Nacional del Litoral (UNL), Santa Fe.

Objetivo: Describir la adherencia al tratamiento de los casos de infección por VIH en la ciudad de Villa María, Córdoba, durante 2011-2015.

Metodología: Se revisaron registros hospitalarios, de diagnóstico, control y entrega de medicamentos de casos de infección por VIH de 2011 a 2016. Se consideró adherentes a los casos con al menos un control clínico, y una carga viral indetectable (o única menor a 200 copias), en el último año; y retiro de medicación en el último trimestre de 2016. Se analizó la asociación entre adherencia y año de

diagnóstico, edad, sexo, y nivel de instrucción.


Se evaluó la significación estadística con el test de Fisher para sexo y nivel de instrucción, y con el método de las permutaciones estocásticas para edad. Se consideró estadísticamente significativo un valor de p menor de 0,05.

Se utilizaron los programas Microsoft Excel 2016, Epidat 3.1. y R 3.2.2.


Resultados:

De los 75 casos nuevos de VIH entre 1999 y 2015 sólo el 25,3% (14,8; 35,8) fueron adherentes. La adherencia fue mayor en casos con diagnóstico reciente: 31,6% (12,6; 56,6) en 2015 y 16,7% (2,1; 48,4) en 2011. Hubo tendencia al aumento (15,4% anual) no estadísticamente significativa ($p=0,28$). No hubo diferencia estadísticamente significativa ($p=0,1348$) en la proporción de adherentes en personas con escolaridad secundaria incompleta o menor: 45,2% y 19,0% y se registraron 3 muertes en el período.

Adherentes y no adherentes al tratamiento por VIH según año de diagnóstico, entre 1999 y 2015 en Villa María, Córdoba, Argentina.



Adherencia al tratamiento de infección por VIH por grupos de edad y sexo. Número y porcentaje. Período 1999-2015 en Villa María, Córdoba, Argentina



Entre las 37 mujeres, la proporción de adherentes fue mayor que entre los 38 varones: 35,1% (18,4; 51,9) y 15,8% (2,8; 28,7), respectivamente; diferencia estadísticamente significativa: $p=0,0478$. Entre los adherentes, la media de edad fue menor en mujeres que en hombres: 27,3 y 38,5; diferencia estadísticamente significativa: $p=0,0064$. No hubo diferencia estadísticamente significativa en la media de edad de los casos adherentes y no adherentes, la variación porcentual de la adherencia por edad y la diferencia de edad entre adherentes y no adherentes, tanto en mujeres como en hombres.

Conclusiones: La adherencia al tratamiento de infección por VIH fue baja; mayor en mujeres que hombres, y con edad más joven en mujeres y en edad mayor en hombres.

Es necesario implementar acciones específicas para aumentar la adherencia, teniendo en cuenta el tiempo de diagnóstico de los casos, el sexo y la edad.