Manejo ambulatorio de las infecciones en adultos

Controversias en el Manejo de Infecciones Respiratorias Altas

Gustavo Lopardo
SADI 2017

Conflictos de Interés

- Sin conflictos de interés en el tema para declarar

Agenda de la Presentación

- Consumo de antibióticos en Infecciones Respiratorias
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en sinusitis aguda
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en faringitis aguda
- Conclusiones

Agenda de la Presentación

- Consumo de antibióticos en Infecciones Respiratorias
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en sinusitis aguda
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en faringitis aguda
- Conclusiones

Antibiotic prescriptions for suspected respiratory tract infection in primary care in South America

Gloria Cordoba^{1*}, Lidia Caballero², Håkon Sandholdt¹, Fátima Arteaga³, Monica Olinisky⁴, Luis Fabián Ruschel⁵, Marjukka Makela⁶ and Lars Bjerrum¹

- Estudio observacional, prospectivo de consumo de antibióticos en infecciones respiratorias en el cono sur de América latina, invierno 2014
- 171 médicos generalistas
- 11446 pacientes
- Todas las edades

Síntomas, Diagnóstico, Demanda y Prescripción de Antibióticos

	Argentina (n=5142)	Bolivia (n= 2229)	Paraguay (n= 3417)	Uruguay (n=658)
Symptoms				
fever	55%	48%	25%	41%
cough and/or rhinorrhoea	69%	87%	80%	79%
pain on swallowing	31%	54%	27%	37%
tonsillar exudate	12%	8%	6%	7%
tender cervical nodes	12%	5%	3%	8%
dyspnoea	13%	5%	7%	14%
purulent sputum	7%	8%	2%	8%
Diagnoses				
common cold	36%	33%	50%	30%
acute pharyngitis	17%	28%	10%	20%
pneumonia	5%	1%	2%	6%
influenza	4%	0.5%	1%	6%
Requested antibiotics	4%	1%	1%	0.5%
Prescribed antibiotics	35%	40%	24%	27%

Prescripción por Diagnóstico y País

Antibióticos Utilizados en cada País

Prescripción de Antibióticos por País

- Ajustado por síntomas y signos, duración de los mismos, diagnóstico y demanda de antibióticos por parte del paciente

Razones que Justificarían la Excesiva Prescripción de Antibióticos

- Falta de test diagnósticos en atención primaria
 - ▣ Test rápido para faringitis aguda, oximetría de pulso
- Ausencia de guías para el manejo de Infecciones respiratorias en atención primaria

Agenda de la Presentación

- Consumo de antibióticos en Infecciones Respiratorias
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en sinusitis aguda
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en faringitis aguda
- Conclusiones

Rinosinusitis Bacteriana Aguda

0,5-2% % de los las rinitis infecciosas agudas se complican con una rinosinusitis bacteriana

El diagnóstico de rinosinusitis bacteriana aguda: clínico-exploratorio

No hay ningún síntoma o signo suficientemente específico para identificar el proceso como bacteriano

Diagnóstico Clínico Probable de Rinosinusitis Aguda Bacteriana

Criterios mayores	Criterios Menores
<ol style="list-style-type: none">1. Secreción nasal purulenta anterior/posterior2. Tos	<ol style="list-style-type: none">1. Cefalea2. Dolor facial3. Edema periorbitario4. Fiebre5. Dolor dental6. Otagia7. Odinofagia8. Halitosis

Diagnóstico probable: si puntuación ≥ 2 mayores o 1 mayor y ≥ 2 menores

Rinosinusitis Bacteriana Aguda

Antibióticos en Sinusitis Bacteriana Aguda: Beneficio leve-moderado

Curación: ventajas moderadas, clínicamente irrelevante (NNT: 14)

- **64-80% de resolución espontánea de síntomas en las 2 primeras semanas**
- **15% de los pacientes presentan síntomas de la rinosinusitis durante más de dos semanas, con o sin tratamiento antibiótico**

Complicaciones:

- **La incidencia de complicaciones graves y la progresión a cronicidad es extremadamente baja**
- **Los antibióticos no han demostrado:**
 - **Disminuir el riesgo de complicaciones, recurrencias, recidivas.**
 - **En revisión sistemática de estudios 0.08% complicaciones supurativas**
 - **Reducir la progresión a la cronicidad**

Efectos adversos: 30-74% de los tratados con antibióticos (diarrea, erupción cutánea, secreción vaginal, cefalea, mareo y astenia).

Eficacia del Tratamiento Antibiótico vs Placebo en Rinosinusitis Bacteriana

Are Antibiotics Effective in the Treatment of Acute Maxillary Sinusitis?

EBEM Commentators

- Estudios que compararon antibióticos vs placebo > 12 años (1915 pacientes)

Mejoría o cura: placebo 86 vs antibióticos 91% (NNT 20)

Análisis de diferentes antibióticos sin diferencia (AMC mayor abandono)

TAKE-HOME MESSAGE

Moderate evidence suggests that antibiotics provide a small clinical benefit for the treatment of acute maxillary sinusitis, defined as a maxillary sinus infection with an onset of fewer than 4 weeks. However, approximately 80% of patients improve within 2 weeks without any antibiotic treatment.

Algoritmo para Diagnóstico y Manejo Inicial de Rinosinusitis Aguda

Algoritmo para Diagnóstico y Manejo Inicial de Rinosinusitis Aguda

Rinosinusitis bacteriana

Indicaciones de tratamiento Precoz

Tratamiento antibiótico justificado desde el inicio:

- Fiebre $> 39^{\circ}\text{C}$
- Cefalea intensa
- Dolor facial o sobre los senos paranasales severo
- Edema de cara o signos de compromiso orbitario periorbitario

Tratamiento Sinusitis Aguda

Tratamiento	Antibióticos
De elección	Amoxicilina 500-1000 mg c/8 - 12 h (AI)
Alternativo	Amoxicilina-clavulánico 500 mg c/8 h u 875 mg c/12 h (de amoxicilina) (AI) Azitromicina 500 mg/día (BI) Claritromicina 500 mg c/12 h (BI) Doxiciclina* 200mg/día (CII)

No hay ensayos clínicos de amoxicilina vs amoxicilina-clavulánico

Sinusitis Aguda: 5 vs 10 días de Tratamiento-Éxito microbiológico

Amoxicilina, azitromicina, cefuroxima, faropenem, gatifloxacina, cefixima, TMS

Sinusitis Aguda: 5 vs 10 días de Tratamiento-Éxito clínico

Terapia no Antibiótica para Rinosinusitis

- **Analgésicos:** el alivio del dolor resulta fundamental ya que con frecuencia es el motivo de la consulta
- **Antihistamínicos:** estas drogas, en particular los nuevos fármacos no sedativos – cetirizina, loratadina y fexofenadina- podrían tener un rol beneficioso para el tratamiento de pacientes con atopía
- **Descongestivos:** los descongestivos tópicos y orales son utilizados frecuentemente para la terapia de la sinusitis aguda. Podrían mejorar la aireación sinusal mediante la apertura del ostium, y reducir la inflamación.
- **Glucocorticoides intranasales:** probabilidad de mejorar los síntomas (73% versus 66.4%; RR 1.11, IC 95%: 1.04-1.18). Furoato de mometasona
- **Glucocorticoides orales** no recomendados

Agenda de la Presentación

- Consumo de antibióticos en Infecciones Respiratorias
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en sinusitis aguda
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en faringitis aguda
- Conclusiones

Agentes Etiológicos Faringitis Aguda

Etiología (inespecíficas)	Observaciones
Vírica (60-80%)	<ul style="list-style-type: none"> • Rhinovirus (20%) • Coronavirus (5%) • Adenovirus (5%) • Herpes simplex 1 y 2 (2-4%) • Virus parainfluenza. Virus Influenza A y B (2%) • Virus Cosackie A (< 1%) • Virus Epstein-Barr, Citomegalovirus (< 1%) • VIH
<i>Streptococcus</i> Beta-hemolítico del grupo A o <i>pyogenes</i> (5-15%)	<ul style="list-style-type: none"> • < 3 años: raro • 3-5 años: poco frecuente • 5-15: alta incidencia (30-55%) <p>Portadores asintomáticos: 4-15% de niños de 5-10 años, 5% en adultos</p>
<i>Streptococcus dysgalactiae</i> subespecie <i>equisimilis</i> (<i>Streptococcus</i> Beta-hemolítico del grupo C y G)	Casos de adultos
<i>Fusobacterium necrophorum</i>	10% de adultos entre 14-25 años (S. Lemierre)
<i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Adolescentes y adultos jóvenes
Anaerobios	< 1%
<i>Chlamydomphila pneumoniae</i> , <i>C. trachomatis</i>	No recurrencias

Faringitis Aguda: Predicción Clínica

Etiología Estreptocócica de la Faringitis Aguda

Streptococcus pyogenes o estreptococo Beta-hemolítico del grupo A (EBHGA)

5-30% de los casos

- **5-15%** de faringitis en adultos
- **15- 30%** en niños

Otros estreptococos

- Adultos (10-15%)

Faringitis Aguda

Diagnóstico Etiológico

Criterios de CENTOR-McISAAC

Cultivo y Test rápido

Criterios Clínicos de Predicción

Criterios Centor

Puntos

Temperatura axilar > 38°	1
Hipertrofia o exudado amigdalares	1
Adenopatías anteriores dolorosas e inflamadas	1
Ausencia de tos	1

Corrección de McISAAC

• 3-14 años	1
• 15-44 años	0
• 45 años o más	-1

Regla	0	1	2	3	4
Centor	2-3 %	3-7%	8-16%	19-34%	41-61%
McIsaac	1-2,5%	5-10%	11-17%	28-35%	51-53%

Juicio clínico: S 49-74%, E 58-76%, para predecir infección por EBHGA

Sistema de Puntuación Clínica Modificado **FeverPAIN**

Fever

Purulence

Attend rapidly (≤ 3
days)

severe **I**nflammation

No cough or coryza

Toma de decisiones
según puntuación
FeverPAIN
mejora los síntomas
notificados y reduce el
uso de antibióticos.

Fever PAIN score of 0-1: only 13-18% have streptococcus, close to background carriage and therefore a no antibiotic strategy is appropriate with discussion.

Fever PAIN score of 2-3: 34-40% have streptococcus, therefore a back-up/delayed antibiotic is appropriate with discussion.

Fever PAIN score of >4: 62-65% have streptococcus, therefore consider immediate antibiotic if symptoms are severe or a short 48 hour delayed antibiotic prescribing strategy may also be appropriate after agreement with the patient and safety netting advice.

Little P, and PRISM investigators. Health Technol Assess. 2014;18(6):vii-xxv, 1-101.

Little P, and on behalf of the PRISM investigators. BMJ Open. 2013; 3(10): e003943

Little P, and on behalf of the PRISM investigators. BMJ. 2013 : 10;347:f5806.

Faringitis Aguda

Tests rápidos

Especificidad: $\geq 95\%$ (≥ 2 criterios Centor)

Sensibilidad: 80-95%

Valor predictivo positivo: 79,2%

Valor predictivo negativo: 98,5%

Específicas para el EBHGA

No descartan *S. dysgalactiae* y *S. anginosus*
(manifestaciones clínicas similares)

Diferentes test rápidos de detección de antígeno del SβHG (TRDA):

TRDA	Sensibilidad	Especificidad	VP Positivo	VP Negativo
Coagulación/látex	75-93%	90-99%	65-95%	93-98%
ELISA	75-96%	97-99%	86-96%	94-99%
Inmunoanálisis óptico	84-99%	95-99%	80-96%	96-99%

Diagnosis and treatment of acute pharyngitis/tonsillitis: a preliminary observational study in General Medicine

F. DI MUZIO, M. BARUCCO, F. GUERRIERO

Azienda Sanitaria Locale Roma 4, Rome, Italy

Uso Racional del Test Rápido para Detectar SBHA

- Criterios de inclusión
 - ▣ Adultos con diagnóstico de faringitis aguda
 - ▣ Mayores: faringitis exudativa o con petequiado
 - ▣ Menores: fiebre, malestar
- Al menos 1 criterio mayor necesario
- A todos se les realizó test rápido Strep A

Uso Racional del Test Rápido para Detectar SBHA

- Se enrolaron 50 pacientes a quienes se les realizó Strep A
- En 45/50 el test fue negativo
- En 5/50 el test fue positivo

Conclusions

Rapid tests, when the Guidelines are applied, can help curb both pharmaceutical expenditure and the inappropriate use of antibiotics.

Reflexive Culture in Adolescents and Adults With Group A Streptococcal Pharyngitis

- IDSA, CDC, American College of Physicians y American Society of Internal Medicine: **en adultos realizar test rápido y con resultado negativo descartar SBHA**
 - ▣ Faringitis causada por SBHA en adultos es infrecuente, sensibilidad del test es 80% y riesgo de complicaciones bajo
- American Heart Association e Institute for Clinical System Improvement: **recomiendan cultivos ante test rápido negativo**
 - ▣ Incrementa la sensibilidad y capaz de detectar estreptococos grupo C y G, *Arcanobacterium haemolyticum*
- FDA: método rápido negativo sin cultivo posterior es *off-label*

Resultados de los Test Rápidos en Pacientes ≥ 13 años

25 786 Total
RADTs performed

- Universidad de Washington
- Periodo de 11 años

22 333 Negative
(86.6%)

3453 Positive
(13.4%)

55% de los test rápidos –
con cultivo +
Centor ≥ 2

21 284 Reflexed
to culture
(95.3%)

1023 Positive for
GAS
(4.8%)

20 261 Negative
for GAS
(95.2%)

Reflexive Culture in Adolescents and Adults With Group A Streptococcal Pharyngitis

- Test rápido fue negativo en 29 pacientes que desarrollaron absceso amigdalino y en 2 con posterior diagnóstico de fiebre reumática (>18 años)
- *Streptococcus* grupo C 965 (4.5%) y grupo G 480 (2.3%), *Fusobacterium necrophorum* 2 casos
- No observaron diferencias en la sensibilidad ni en el riesgo de complicaciones entre adolescentes y adultos
- **Conclusión:** muchas guías sugieren no cultivar a los adultos por bajo riesgo de SBHA y bajo riesgo de complicaciones. Este estudio muestra que los riesgos existen

Complicaciones de la Faringitis Aguda

No supurativas

- Fiebre reumática (TI: $<1 / 100.000$, países desarrollados)
- Glomerulonefritis postestreptocócica

Supurativas (1-2%)

- Flemón, absceso periamigdalino
- Absceso retrofaríngeo
- Otitis media aguda, sinusitis, mastoiditis
- Adenitis cervical supurativa
- Excepcionales: tromboflebitis de la vena yugular interna (síndrome de Lemierre), fascitis necrotizante, meningitis, abscesos

Faringitis Aguda: Riesgo de Complicaciones con Tratamiento Inmediato vs Diferido vs no Tratamiento

	Not given antibiotics	Given antibiotics	Delayed antibiotics
Clinical assessment			
Mean (SD) severity of sore throat and difficulty in swallowing on a four-point Likert scale	2.92 (0.71)	3.31 (0.63)	3.02 (0.69)
Previous duration in days	4.88 (6.62)	4.65 (4.14)	4.11 (3.18)
Age in years	34.6 (15.4)	32.7 (14.2)	33.8 (14.4)
Female	3325/4805 (69%)	4030/6088 (66%)	1282/1784 (72%)
Smoker	919/4774 (19%)	1395/6060 (23%)	327/1769 (18%)
Fever in past 24 h	2084/4414 (47%)	3965/5524 (72%)	873/1600 (55%)
Temperature (°C)	36.65 (0.61)	36.99 (0.74)	36.75 (0.60)
Pus on tonsils	329/4776 (7%)	3638/6052 (60%)	473/1779 (27%)
Severely inflamed tonsils	56/4486 (1%)	1334/5674 (24%)	101/1628 (6%)
Number of previous medical problems	0.24 (0.51)	0.24 (0.51)	0.24 (0.50)
Return within 4 weeks with new or worsening symptoms	764/4536 (17%)	846/5750 (15%)	177/1664 (11%)
Days delay for those receiving delayed antibiotics	..	..	3.52 (6.32)
Return within 4 weeks with complications	73/4536 (2%)	75/5750 (1%)	16/1664 (1%)
Individual complications			
Quinsy	11/4536 (0.24%)	30/5750 (0.52%)	4/1664 (0.24%)
Sinusitis	23/4536 (0.49%)	10/5750 (0.17%)	2/1664 (0.12%)
Otitis media	30/4536 (0.66%)	26/5750 (0.45%)	10/1664 (0.60%)
Cellulitis or impetigo	10/4536 (0.22%)	9/5750 (0.16%)	0/1664 (0.00%)

Complicaciones 1.4%

NNT 193

NNT 174

Faringitis Aguda ¿Antibióticos?

Tratar casos confirmados de infección estreptococcica (Test rápido o cultivo)

Si no se dispone de Test rápido o es negativo y existe alta sospecha de origen bacteriano de faringitis aguda (4-5 puntos de los criterios de Centor-Mclsaac) realizar cultivo

No tratar puntuaciones de 2 o 3

Red Latinoamericana de Vigilancia de la Resistencia a los Antimicrobianos

1965 cepas de *S. pyogenes* año 2015

Total	Nº		Antibiótico	Porcentaje	
	Nº	Intermedia		Resistente	Intermedia
1965		0	PEN		0
1965	16	12	LVX	0,80	0,60
1965	29	39	CLI	1,50	2,00
1965	65	39	ERI	3,30	2,00
NT	#¡VALOR!	#¡VALOR!	TCY	NT	NT

Tratamiento

Faringitis estreptocócica

Situación clínica	Tratamiento de elección	Alternativa
Faringoamigdalitis por EBHGA*	Penicilina V, VO, durante 10 días: 500 000 U/kg/día divididas en 2 dosis, peso < 27 kg 750 000 U c/12 h, peso ≥ 27 kg	Amoxicilina, VO, 50 mg/kg/día (máximo 1 g/día) en 1 o 2 dosis durante 10 días
Alergia a penicilina	Claritromicina, VO, 15 mg/kg/día, en 2 dosis durante 10 días o Clindamicina, VO, 15-25 mg/kg/día, en 3 dosis durante 10 días	Azitromicina, VO, 10-12mg/kg/día (máximo 500 mg/día) en 1 o 2 dosis durante 5 días
Intolerancia digestiva o mala adherencia al tratamiento oral	Penicilina benzatínica, IM, en dosis única: 600 000 U, peso <27 kg 1 200 000 U, peso ≥ 27 kg	

Agenda de la Presentación

- Consumo de antibióticos en Infecciones Respiratorias Altas (IRA)
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en sinusitis aguda
- Estrategias para una menor prescripción de antibióticos en faringitis aguda
- **Conclusiones**

Conclusiones

- Reducir la prescripción de antibióticos es una necesidad
- Rinosinusitis aguda y faringitis aguda en adultos pocos casos requieren tratamiento antibiótico
- Los beneficios del tratamiento antibiótico son limitados
- Los métodos rápidos de detección de SBHA pueden contribuir al uso racional de antibióticos, en algunos casos el cultivo aporta información relevante

Organized by the International Society for Infectious Diseases in collaboration with the Sociedad Argentina de Infectología (SADI)

BUENOS AIRES, ARGENTINA
MARCH 1-4, 2018

18th International Congress on Infectious Diseases

XVIII Congreso SADI

WWW.ISID.ORG/ICID

- Actualizaciones en Medicina Tropical
- Resistencia a Antimicrobianos, Control de Infecciones, VIH y TB
- Enfermedades Infecciosas Emergentes
- Infecciones en Poblaciones Especiales
- Manejo Personalizado de las Infecciones
- Innovación, IT y enfermedades infecciosas

**Envío de resúmenes
fecha límite 3 de
noviembre de 2017**

Hospital Municipal de Vicente López
Prof. Dr. Bernardo Houssay
Asociado a la Facultad de Medicina
Universidad de Buenos Aires

Muchas gracias

GLOPARDO@INTRAMED.NET